



Durgum en omstreken

# Weetjes.

Inhoudsopgave:

## Hoenders

- Ziekten.
- Kippen en voer/drinken.
- Bacteriën en parasieten.
- Broeden

## Konijnen

- -
- 

---

## Hoenders

### Ziekte:

- Een verstopte krop kan te wijten zijn aan het eten van vers gras.  
Bron: Levende have.

### Kippen en voer:

- Kippen zijn knoeiers. Als ze een open voerbak tot hun beschikking hebben, ligt binnen de kortste keren een deel van het kostbare voer op de grond. Kippen die los lopen en alleen er maar wat voer bij krijgen, kunnen het beste 's morgens en aan het eind van de middag – voor het op stok gaan – een handje legkorrel van de schaal pillen. Dat gaat meestal schoon op. Tussendoor kan nog wat graan worden gestrooid, maar niet teveel want van graan vervetten de kippen snel. Moeten de kippen permanent kunnen beschikken over legkorrel, maak dan gebruik van een hangende voerbak of voersilo die gelijkmatig het voer afgeeft. Er zijn ook bakken met een trapplaat: gaan de kippen daarop staan, dan komt er weer voer. Zorg ervoor dat de klep niet teveel lawaai maakt. Kippen kunnen daarvan schrikken en laten het eten staan. Plaats een stukje vilt op de klep.  
Bron: Levende have.
- Appelazijn: is onontbeerlijk voor de stofwisseling, zeker voor het afbreken van de vetten. Appelazijn werkt prestatieverhogend. Bovendien bevat het alle benodigde spoorelementen. Appelazijn is bovendien een ideaal middel om het drinkwater te desinfecteren.  
Bron: Levende have.
- Ruwvoer (gedroogde luzerne, snijmaïs of gras) in scharrelruimte of bakken houdt de kippen lekker bezig. Ruwvoer voorziet ook in de behoefte aan structuur; belangrijk voor de darmwerking en darmflora en du voor de algehele weerstand. De meeste kippen die buiten rondscharrelen, neme zelf voldoende ruwvoer op. Kippen die in een



ren worden gehouden, kan men af en toe paar handjes (2-5 gr. Per dier, per dag) geven. Ook kan er in de ren een baaltje hooi of stroo worden gelegd, met een net of gaas eromheen. Wilt u echt uw kippen aan het werk zetten, verspreid het ruwvoer dan over de ruimte zodat alle dieren erbij kunnen. Wissel het ruwvoer af, zodat de kippen er niet op uitgekeken raken. Kippen houden van vakantie.  
Bron: Levende have.

•

## **Bacteriën en parasieten.**

- Ciderazijn:  
Een scheutje ciderazijn – 10 ml op 500 ml water – bij het drinkwater is goed tegen bacteriën en parasieten. Het versterkt bovendien de darmwerking en zou de weerstand van de kip bevorderen. Het beste is de ciderazijn niet dagelijks of over een langere periode te geven, maar periodiek op momenten dat de kip deze stof goed kan gebruiken, bijvoorbeeld voorafgaande aan de rui of een broedperiode. Voeg niet tegelijkertijd vitamines en andere supplementen toe, want de werking daarvan kan wel eens door de ciderazijn teniet worden gedaan. Gebruik ciderazijn alleen in plastic waterbakken. Bakken van gegalvaniseerd ijzer worden door cider aangetast en daarbij komt zink vrij dat de kippen kan vergiftigen.  
Bron: Levende have.

## **Broeden:**

- Maximale bevruchtingresultaten worden pas verkregen twee tot drie dagen na de paring. Na de paring – ook wel de “cloaca-kus” genoemd – wordt het sperma door de hen opgeslagen in speciale klieren in de eileider (uterovaginaalklieren). Dankzij deze voorraad kan de hen – zonder dat de haan dagelijks hoeft te treden – acht tot tien dagen na de laatste succesvolle paring nog bevruchte eieren produceren. Het aantal bevruchte eieren is dan wel minder vergeleken met de bevruchting van enkele dagen na de paring. Het is uitzonderlijk maar wel mogelijk dat tot 35 dagen na de laatste paring nog bevruchte eieren worden geproduceerd. Kortom: als je alleen let op de bevruchting is het verstandig om de haan tenminste drie dagen van tevoren bij de hennen te plaatsen. Een haan heeft overigens nog meer taken dan het bevruchten van zijn hennen, zoals het bewaken van zijn koppel hennen en andere zaken die verband houden met zijn hoogste plaats in de pikorde. Let daarom eens op het gedrag van de hennen: wordt de haan geaccepteerd en treed de haan op de juiste wijze?  
Bron: Levende have.
- Wilt u eieren bewaren voor de broed? Zet er dan met potlood de legdatum op en noteer van welke hen het ei afkomstig is. De eieren



Durgum en omstreken

## Weetjes.

kunnen bij een temperatuur van ongeveer twaalf graden worden bewaard in een niet al te droge omgeving. Keer de eieren dagelijks om. Zet ze de ene dag op de kop en de andere dag op de "kont". Op deze manier kunnen de eieren zo'n twee weken worden bewaard. Langer is niet wenselijk. De kiemkracht gaat na veertien dagen achteruit.

Bron: Levende have.